



Ciechanów, 12 grudnia 2017r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Ciechanowie

Mariusz Dobosz

Nasz znak: PIW-OZZ.5200.163.2017

SOŁECZNA

URZĄD GMINY 06-456 Ojrzeń		
WPŁY NEKO 2017 -12- 14		
skierowano	termin zał.	czytano

[Signature]

Według rozdzielnika

Granowin Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przesyła w załączeniu ulotki informacyjne dla hodowców związane z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie uprzejmie proszę o zapoznanie z ich treścią mieszkańców Państwa Gmin z terenu powiatu ciechanowskiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem

[Signature]
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Ciechanowie
lek. wet. Mariusz Dobosz

Rozdzielnik:

1. Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
2. Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
3. Urząd Miasta i Gminy Głinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Głinojeck
4. Urząd Gminy Gołymin Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
5. Urząd Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
6. Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
7. Urząd Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasieńskiego, 06-406 Opinogóra Górna
8. Urząd Gminy Regimin, 06-461 Regimin
9. Urząd Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 60, 06-400 Ciechanów
11. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Letnia 17, 06-400 Ciechanów,
tel: (23)672 28 56 fax: (23)672 46 40,

e-mail: sekretariat@piw-ciechanow.pl <http://www.piw-ciechanow.pl>





UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnię.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkazanie rąk i obuwia**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnię i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności